



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0555078 23/11/2020 12,31

Mitt. : 500406 Politica del farmaco e disposi...

Dest. : AI DIRETORI GENERALI DELL AA.SS.LL.DELLA REGIONE CAMPA...

Classifica : 50.4. Fascicolo : 57 del 2020



-Ai Direttori Generali delle AA.SS.LL.

e, per il Loro tramite

- Ai MMG-PLS

-Ai Medici Prescrittori

Ai Direttori dei Dipartimenti Farmaceutici

- A FEDERFARMA

- A ASSOFARM

Oggetto: Ossigenoterapia domiciliare paziente COVID-19 e appropriatezza prescrittiva

Con la presente si chiede alle SS.LL. in indirizzo, relativamente all'emergenza riscontrata su tutto il territorio nazionale, di garantire le forniture di ossigeno a favore di assistiti affetti da Covid-19 terapia domiciliare.

A tal proposito, si sottolinea che l'ossigeno, prescritto nei casi previsti, si rivela un farmaco indispensabile e, in taluni casi, salvavita per i pazienti positivi al Sars-CoV2 trattati presso il proprio domicilio. Ciò riveste particolare importanza in considerazione del fatto che tali pazienti, in assenza del servizio domiciliare, diventano eleggibili a ricoveri in strutture ospedaliere con un impatto rilevante sul SSR.

La Scrivente Direzione ha posto in essere una serie di misure utili a favorire le forniture di ossigeno favorendo il riempimento delle bombole del gassoso, emanando procedure di autorizzazione alla prescrizione e alla fornitura in DPC di ossigeno liquido e concentratori.

Tuttavia, al fine di garantire sul territorio le forniture agli aventi diritto, è essenziale che tutti gli attori del processo collaborino nell'adottare le più stringenti iniziative volte ad ottimizzarne l'utilizzo in maniera appropriata.

Pertanto, si invitano tutti i MMG/PLS a seguire strettamente le indicazioni di appropriatezza prescrittiva dell'ossigeno nell'assistito affetto da Covid-19, tenendo conto che il farmaco va utilizzato esclusivamente nei casi in cui la percentuale di saturazione dell'ossigeno nel sangue abbia un valore inferiore a 92, ad eccezione del caso in cui le condizioni cliniche del paziente ne suggeriscano la somministrazione a condizioni diverse. Inoltre, è necessario che tale parametro venga sottoposto a continuo monitoraggio.

Le prescrizioni di ossigeno liquido devono necessariamente indicare il flusso di somministrazione (lt/min e h/die).

Viste tutte le problematiche di reperibilità del medicinale, si invitano medici e farmacisti a monitorare in base al dosaggio prescritto, i tempi di permanenza dei contenitori (bombole) presso il domicilio degli assistiti, affinché le bombole vuote possano essere tempestivamente ricaricate e riallocate per il successivo utilizzo.

Si invitano i Servizi Farmaceutici delle AA.SS.LL. a condividere con i medici prescrittori e con le farmacie di comunità le linee di indirizzo relativi alle prescrizione dei farmaci utilizzati per pazienti Covid-19, compreso l'ossigeno in quanto si evidenziano da una prima analisi condizioni di inappropriatazza.

Il Dirigente UOD 06
Dott. Ugo Trama

Il Direttore Generale
Avv. Antonio Postiglione